Только къ вечеру утихло нѣсколько общее волненіе. Разговорамъ не было конца. Замѣчательно, что рыба появилась только на протяженіи 5-ти 6-ти верстъ по берегу и держалась преимущественно правой стороны. Въ другихъ прибрежныхъ селахъ, расположенныхъ выше нашего, а равно и ниже, начиная съ села Черкизова (10 верстъ отъ Коломны), появленія рыбы не замѣчено.—Результатъ ловли въ теченіи нѣсколькихъ часовъ, самое меньшее,—200 пудовъ и все крупной рыбы.—Замѣчательно также и то обстоятельство, что въ числѣ разныхъ породъ рыбъ не было ни одного леща, которыхъ въ Москвѣ рѣкѣ, особенно по плесамъ нашего села, очень много, и рыбаки, ловящіе лѣтомъ и осенью большой снастью, т. е. огромнымъ неводомъ, вытаскиваютъ въ каждую тоню большое количество почти одного леща. Не попалось тоже ни одного сомёнка или сома, которыхъ впрочемъ въ нашей рѣкѣ относительно мало.

23-е Марта 1887 г.
с. Ачкасово.

П. Стрекаловъ.

Изъ С.-Петербурга. — Въ субботу, 11 Апрѣля, состоялось первое Общее собраніе Общества Любителей породистыхъ собакъ. Предметомъ занятій собранія было: 1. Выборъ должностныхъ лицъ, причемъ оказались по баллотировкѣ избранными: Вице-президентами общества: Графъ Рибопьеръ и Ю. Ф. Янсонъ; въ члены совѣта: В. Л. Кушелевъ, Н. И. Макаровъ, П. Ф. Дурасовъ, В. Р. Дицъ и Ю. Ф. Рейка; Секретаремъ Общества А. К. Де-Юнкеръ, казначеемъ Е. Е. Мюссаръ. 2. При обсужденіи ближайшей дѣятельности общества, большинствомъ голосовъ было рѣшено устроить въ Августѣ мѣсяцѣ настоящаго года полевыя испытанія подружейнымъ собакамъ (легавымъ), для чего и поручено Совѣту выработать правила и представить ихъ на благоусмотрѣніе общества не позже 1-го Іюля.

С. О.

Два вида лосей (Cervus Alces). — Въ нашей, Псковской, губерніи водятся двѣ, рѣзко другъ отъ друга отличающіяся, породы лосей: одни черные большіе, другіе сѣрые поменьше. Первые вѣсятъ отъ 20—25 пуд., другіе отъ 12 до 18 пуд. Ростъ ихъ почти одинаковъ, но первые несравненно массивнѣе. У первыхъ шерсть на головѣ, шеѣ, груди, спинѣ и верхнихъ частяхъ ногъ совершенно черная и гораздо длиннѣе; у вторыхъ шерсть сѣропепельнаго цвѣта, немного темнѣе на шеѣ, спинѣ, груди и верхнихъ частяхъ ногъ.

Что это совершенно отдѣльныя породы, видно изъ того, что цвѣтъ шерсти ни лѣтомъ, ни зимою не измѣняется и остается таковымъ-же до самой старости. Независимо отъ сего и самые рога ихъ, какъ нельзя болѣе, отличаются одни отъ другихъ. Такъ, въ то время, какъ рога черныхъ лосей представляютъ толстые, граненые огромные отростки безъ лопастей и чѣмъ старѣе, тѣмъ длиннѣе, рога сѣрыхъ ло-